Introduction au Machine learning : devoir maison

Exercice 1

Le but de cet exercice est de montrer l'inégalité d'Hoeffding, selon laquelle si $V_1, \dots, V_n$ sont les variables indépendantes et bornées (pour tout i $V_i \stackrel{p.s.}{\in} [a_i, b_i]$) alors, pour tout $t > 0$

$$\mathbb{P}(\bar{V}_n - \mathbb{E}(\bar{V}_n) > t) \leq \exp\left(-\frac{\gamma n^2 t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\right)$$

où $\bar{V}_n = (1/n) \sum_{i=1}^n V_i$, et γ dépend de la démonstration et vaut 2 dans le meilleur cas !

1. On commence par montrer que si W est une variable aléatoire centrée ($\mathbb{E}(W) = 0$) et telle que $W \stackrel{p.s.}{\in} [\alpha, \beta]$ alors pour tout $s \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{E}(\exp(sW)) \leq \exp(s^2(\beta - \alpha)^2/2).$$

- (a) Justifier que $\mathbb{E}(\exp(sW))$ existe bien puis que pour tout s

$$\mathbb{E}(\exp(sW)) = \mathbb{E}(\exp(s(W - \mathbb{E}(W'))))$$

où W' est une copie indépendante de W .

- (b) Montrer que la convexité de la fonction $\exp$ et l'inégalité de Jensen entraînent

$$\mathbb{E}(\exp(sW)) \leq \mathbb{E}(\exp(s(W - W'))).$$

- (c) On introduit une variable de Rademacher ε (c'est-à-dire telle que $\mathbb{P}(\varepsilon = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon = -1) = 1/2$), indépendante de W et W' , montrer que $W - W'$ et $\varepsilon(W - W')$ ont même loi.
- (d) Montrer que

$$\mathbb{E}(\exp(s\varepsilon(W - W'))) = \frac{1}{2}\mathbb{E}(\exp(s(W - W'))) + \frac{1}{2}\mathbb{E}(\exp(-s(W - W'))).$$

- (e) Montrer que $|W - W'| \stackrel{p.s.}{\leq} \beta - \alpha$ puis que

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\mathbb{E}(\exp(s(W - W'))) + \frac{1}{2}\mathbb{E}(\exp(-s(W - W'))) &\leq \mathbb{E}(\exp(s^2(W - W')^2/2)) \\ &\leq \exp(s^2(\beta - \alpha)^2/2) \end{aligned}$$

en utilisant les développements en série entière des fonctions $\cosh$ et $\exp$.

- (f) Conclure.

2. Montrer successivement que pour tout $\lambda > 0$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\bar{V}_n - \mathbb{E}(\bar{V}_n) > t) &= \mathbb{P}\left\{\exp\left(\lambda \sum_{i=1}^n (V_i - \mathbb{E}(V_i))\right) > \exp(\lambda nt)\right\} \\ &= \mathbb{P}\left\{\exp\left(\lambda \sum_{i=1}^n (V_i - \mathbb{E}(V_i)) - \lambda nt\right) > 1\right\} \\ &= \mathbb{E}\left\{\mathbb{1}_{\exp\left(\lambda \sum_{i=1}^n (V_i - \mathbb{E}(V_i)) - \lambda nt\right) > 1}\right\}. \end{aligned}$$

3. Justifier que pour un réel $a \geq 0$

$$\mathbb{1}_{a > 1} = 1 \mathbb{1}_{a > 1} \leq a \mathbb{1}_{a > 1} \leq a.$$

En déduire que

$$\mathbb{E}\left\{\mathbb{1}_{\exp\left(\lambda \sum_{i=1}^n (V_i - \mathbb{E}(V_i)) - \lambda nt\right) > 1}\right\} \leq \mathbb{E}\left\{\exp\left(\lambda \sum_{i=1}^n (V_i - \mathbb{E}(V_i)) - \lambda nt\right)\right\}$$

4. Justifier que

$$\mathbb{E}\left\{\exp\left(\lambda \sum_{i=1}^n (V_i - \mathbb{E}(V_i))\right)\right\} = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}\left\{\exp\left(\lambda (V_i - \mathbb{E}(V_i))\right)\right\}.$$

5. Justifier que pour tout $i = 1, \dots, n$

$$\frac{V_i - \mathbb{E}(V_i)}{b_i - a_i} \stackrel{p.s.}{\in} [-1, 1]$$

et en déduire une borne pour

$$\mathbb{E}\left\{\exp\left(\lambda \sum_{i=1}^n (V_i - \mathbb{E}(V_i))\right)\right\},$$

et conclure.

Exercice 2

On veut étudier l'algorithme des k plus proches voisins dans le cas où $k = 1$. On se place dans le cas où

- les covariables $X_i \in \mathcal{X} \subset [0, 1]^d$
- les $Y_i \in \{0, 1\}$.
- les couples (X_i, Y_i) sont i.i.d. de loi inconnue $\mathcal{L}$
- on note $\mathcal{D}_n = \{(X_i, Y_i), i = 1, \dots, n\}$.

On considère de plus la perte 0/1 de sorte que le risque d'un classifieur est donné par

$$R(c) = \mathbb{E}_{\mathcal{L}}(\ell(Y_+, c(X_+)) | \mathcal{D}_n) = \mathbb{E}_{\mathcal{L}}(\mathbb{1}_{Y_+ \neq c(X_+)} | \mathcal{D}_n)$$

où (X_+, Y_+) est indépendant des (X_i, Y_i) et de même loi.

1. On va étudier des classifieurs non-déterministes, c'est-à-dire qui dépendent des données. On note $\hat{c}$ un tel classifieur. Comme on va intégrer par rapport aux lois de (X_+, Y_+) et $\mathcal{D}_n$ alternativement on va noter dans cette question

- $\mathbb{E}_{(X_+, Y_+) \sim \mathcal{L}}$ quand on intègre par rapport à la loi de (X_+, Y_+)
- $\mathbb{E}_{\mathcal{D}_n \sim \mathcal{L}}$ quand on intègre par rapport à la loi de $\mathcal{D}_n$

avec ces notations

$$R(\hat{c}) = \mathbb{E}_{(X_+, Y_+) \sim \mathcal{L}}(\ell(Y_+, \hat{c}(X_+))).$$

Vérifier que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\mathcal{D}_n \sim \mathcal{L}}(R(\hat{c})) &= \mathbb{E}_{\mathcal{D}_n \sim \mathcal{L}}\left(\mathbb{E}_{(X_+, Y_+) \sim \mathcal{L}}(\ell(Y_+, \hat{c}(X_+)) | \mathcal{D}_n)\right) \\ &= \mathbb{E}_{(X_+, Y_+) \sim \mathcal{L}}\left(\mathbb{E}_{\mathcal{D}_n \sim \mathcal{L}}(\ell(Y_+, \hat{c}(X_+)) | (X_+, Y_+))\right) \end{aligned}$$

2. Dans toute la suite, chaque Y_i suit la loi de Bernoulli de paramètre $\pi^* = 3/4$ pour toute valeur de X_i , c'est-à-dire

$$\mathbb{P}_{\mathcal{L}}(Y_i = 1 | X_i = x) = \pi^* = 3/4 \text{ pour tout } x \in \mathcal{X}.$$

Montrer que Y_i est indépendant de X_i . Proposez alors un classifieur déterministe (qui ne dépend pas de $\mathcal{D}_n$) c_0 , c'est-à-dire une fonction de $\mathcal{X}$ dans $\{0, 1\}$, qui vous paraît convenir au problème.

3. Montrer que le risque d'un classifieur déterministe c peut s'écrire successivement

$$R(c) = \mathbb{E}_{\mathcal{L}}(\mathbb{1}_{Y_+ \neq c(X_+)}) = \pi^* + (1 - 2\pi^*)\mathbb{E}_{\mathcal{L}}(c(X_+)).$$

(a) Montrer que, pour tout classifieur déterministe c ,

$$0 \leq \mathbb{E}_{\mathcal{L}}(c(X_+)) \leq 1.$$

En déduire une borne inférieure de $R(c)$ et la valeur de $\mathbb{E}_{\mathcal{L}}(c(X_+))$ pour laquelle elle est atteinte.

(b) En déduire que l'oracle c^* qui vérifie $c^* = \operatorname{argmin}_c R(c)$ vaut c_0 .

(c) Calculer le risque de l'oracle.

4. On considère le classifieur du plus proche voisin (1 plus proche voisin) noté $\hat{c}_1$. Pour chaque $x \in \mathcal{X}$, on introduit les v.a. $Z_i(x)$ ($i = 1, \dots, n$) définies par

$$Z_i(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ est le plus proche voisin de } x \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

(a) Vérifier que $\sum_{i=1}^n Z_i(x) = 1$.

(b) Montrer que $\hat{c}_1(x) = \sum_{i=1}^n Z_i(x)Y_i$.

(c) Déduire de la question 1 que

$$\mathbb{E}_{\mathcal{D}_n \sim \mathcal{L}}(\hat{c}_1(x)) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}_{\mathcal{D}_n \sim \mathcal{L}}(Z_i(x)Y_i) = \pi^*.$$

(d) En déduire que

$$\mathbb{E}_{\mathcal{D}_n \sim \mathcal{L}}(\ell(Y_+, \hat{c}_1(X_+)) | (X_+, Y_+)) = 3/8.$$

5. Déduire des questions 1 et 4 que $\mathbb{E}_{\mathcal{D}_n \sim \mathcal{L}}(R(\hat{c}_1)) = 3/8$.

6. En déduire que le risque intégré de $\hat{c}_1$ ne tend pas vers celui de l'oracle c^* .

7. Expliquer pourquoi.